



IMAGINE...

Aumentar la eficiencia del laboratorio y tratar de más pacientes

La FA es una epidemia mundial que afecta aproximadamente a
33 millones^{1,2} y está aumentando



Aprox.

50-70%

de la carga financiera de la FA se atribuye a los

COSTOS DE HOSPITALIZACIÓN³



LA VENTAJA DEL

HEMOSTASIA INMEDIATA Y DURADERA



Puede confirmarse y cuestionarse en la mesa⁴ mientras el paciente está tomando anticoagulantes en dosis completa..⁵



Disponible ahora

para uso en venas femorales comunes con vainas pequeñas y grandes (5F-24F⁴, Max OD 29F⁷).

PERCLOUSE™

AMBULACIÓN EN



PROSTYLE™

↓ 1,9%

Tasa baja de complicaciones graves⁶

Sin

Recurrencias tardías de sangrado⁴

El uso del sistema de reparación y cierre mediado por sutura Perclose™ ProStyle™ puede ayudar a:

AUMENTAR

la eficiencia del laboratorio de EP

MINIMIZAR

costos evitables

MEJORAR

la experiencia del paciente



Hemostasia y deambulación más rápidas



Optimización de Recursos Clínicos



Rotación de pacientes más rápida

- Supervisión
- Nuevo sangrado
- Estancia hospitalaria
- Analgésico
- ITU por catéter de Foley
- Complicaciones del sitio de acceso



Reposo en cama y estancia hospitalaria más breves



Menos analgésicos



Menos necesidad de catéter Foley

FUENTE: S. Verma. Adopting a Strategy of Early Ambulation and Same-Day Discharge for Atrial Fibrillation Ablation Cases - *EPLab Digest* - May 2019.

Vale la pena pensar en eso.

La información contenida en este documento es para DISTRIBUCIÓN en América Latina, excepto México y Brasil. Confirme el estado regulatorio del dispositivo en su país.

©2024 Abbott. Todos los derechos reservados. MAT-2311806 v2.0

Pág. 1 de 2

Perclose™ ProStyle™

Sistema de reparación y cierre mediado por sutura

1. Chugh SS, et al. Circulation 2014 Worldwide Epidemiology of AF - A Global Burden of Disease Study 2010.
2. Rahman F, et al. Nat. Rev. *Cardiol.* 11, 639–654 (2014).
3. Patel NJ, et al. Global rising trends of atrial fibrillation - a major public health concern. June 2018.
4. As per Instructions for Use (IFU), patients may be ambulated 2 hours after the Perclose ProGlide SMC system procedures using 5F-8F sheaths. For sheaths > 8F, ambulation time is at the physician's discretion. Perclose ProGlide SMC System – Instructions for Use. Data on file at Abbott.
5. Mahavaden VS, et al. Pre-closure of femoral venous access sites used for large-sized sheath insertion with the Perclose device in adults undergoing cardiac intervention.
6. Kar S, et al. The Use of the Perclose ProGlide Suture-Mediated Closure (SMC) Device for Venous Access Site Closure up to 24F Sheaths. CRT 2018.
7. Max. OD 29F/0.378 inches/9.59 mm. Tests performed by and data on file at Abbott.

PRECAUCIÓN: Este producto está diseñado para ser utilizado por o bajo la dirección de un médico. Antes de su uso, es importante leer detenidamente las Instrucciones de Uso de este dispositivo contenidas en el empaque del producto para información más detallada sobre las Indicaciones, Contraindicaciones, Advertencias, Precauciones y Complicaciones Potenciales asociadas al uso de este dispositivo. Este material está destinado solamente para uso por profesionales de la salud.

La información contenida en este documento es para **DISTRIBUCIÓN** en América Latina, excepto México y Brasil. Confirme el estado regulatorio del dispositivo en su país.

Todos los dibujos son solo representaciones artísticas y no deben considerarse como dibujos de ingeniería o fotografías. Fotografías en archivo de Abbott.

Datos archivados en Abbott.

Abbott Vascular CALA
Rua Michigan 735, Sao Paulo, Brasil. 04566-905

[™] indica una marca registrada del Grupo de Empresas de Abbott.
‡ Indica una marca comercial de un tercero, que es propiedad de su respectivo propietario.

