

A FA é uma epidemia mundial que afeta aproximadamente

33 MILHÕES^{1,2} e está em ascensão



Cerca **50-70%** da carga financeira da FA é atribuível a **CUSTOS DE HOSPITALIZAÇÃO³**



A VANTAGEM DO PERCLOSE™ PROSTYLE™

HEMOSTASIA IMEDIATA E DURÁVEL



Pode ser confirmada e contestada na mesa⁴ enquanto o paciente estiver em dose plena de anticoagulantes.⁵



AGORA DISPONÍVEL

para uso em veias femorais comuns com bainhas pequenas e grandes (5F-24F⁴, Max OD 29F⁷).

AMBULAÇÃO EM



↓ 1,9%

Baixo índice de complicações maiores⁶

SEM

Recorrências tardias de sangramento⁴

O uso do sistema de fechamento e reparo mediado por sutura Perclose™ ProStyle™ pode ajudar a:

AUMENTAR

Eficiência do Lab de EP



Hemostasia e deambulação mais rápida



Otimização de Recursos Clínicos



Rotatividade mais rápida de pacientes

MINIMIZAR

Custos evitáveis



Monitoramento



Novo sangramento



Internação



Medicação para dor



ITU por cateter de Foley




Complicações do local de acesso



Menor Repouso de Cama e Permanência Hospitalar



Menos medicação para dor



Minimiza a necessidade de cateter de Foley

FONTE: S. Verma. Adopting a Strategy of Early Ambulation and Same-Day Discharge for Atrial Fibrillation Ablation Cases - EP Lab Digest - May 2019.

Vale a pena pensar nisso.

1. Chugh SS, et al. Circulation 2014 Worldwide Epidemiology of AF - A Global Burden of Disease Study 2010.
2. Rahman F, et al. Nat. Rev. *Cardiol.* 11, 639–654 (2014).
3. Patel NJ, et al. Global rising trends of atrial fibrillation - a major public health concern. June 2018.
4. As per Instructions for Use (IFU), patients may be ambulated 2 hours after the Perclose ProGlide SMC system procedures using 5F-8F sheaths. For sheaths > 8F, ambulation time is at the physician's discretion. Perclose ProGlide SMC System – Instructions for Use. Data on file at Abbott.
5. Mahavdaven VS, et al. Pre-closure of femoral venous access sites used for large-sized sheath insertion with the Perclose device in adults undergoing cardiac intervention.
6. Kar S, et al. The Use of the Perclose ProGlide Suture-Mediated Closure (SMC) Device for Venous Access-Site Closure up to 24F Sheaths. CRT 2018.
7. Max. OD 29F/0.378 inches/9.59 mm. Tests performed by and data on file at Abbott.

PERCLOUSE PROSTYLE DISPOSITIVO DE ENCERRAMENTO POR SUTURA - Registro ANVISA nº 80146502366.

CUIDADO: Este produto deve ser usado por ou sob a orientação de um médico. Antes de usar, consulte as Instruções de Uso, dentro da embalagem do produto (quando disponível) para obter informações mais detalhadas sobre Indicações, Contraindicações, Avisos, Precauções e Eventos Adversos. Este material deve ser usado apenas por profissionais de saúde.

As ilustrações são apenas representações de artistas e não devem ser consideradas como desenhos ou fotografias de engenharia. Fotos nos arquivos da Abbott.

As informações aqui contidas são para DISTRIBUIÇÃO SOMENTE no Brasil.

TM Indica uma marca comercial do grupo de empresas Abbott.

Abbott Laboratórios do Brasil Ltda.
Rua Michigan, 735 – Brooklin
São Paulo – SP – 04566-905 -Brasil

Central de Relacionamento com Cliente: 0800 703 105

©2023 Abbott. Todos os direitos reservados. MAT-2311598 v1.0

